

LINEE GUIDA ALLA DONAZIONE DEL SANGUE

CRITERI DI AMMISSIONE O DI ESCLUSIONE ALLA DONAZIONE

COSA DEVI SAPERE PRIMA DI DONARE

- **Età:** dai 18 ai 70 anni - superati i 60 anni ai donatori periodici è richiesto ECG recente
- **Peso:** non inferiore a 50 kg
- **P.A. MAX:** 110-160 **P.A. MIN:** 60-100
- **HB Uomo:** $\geq 13,5$ g/dl
- **HB Donna:** $\geq 12,5$ g/dl
- **F.C:** tra i 50-60 e i 100 bpm
- **Intervallo minimo tra due donazioni:**
 - **Ogni 90 giorni (2 volte l'anno):** Donna in età fertile
 - **Ogni 90 giorni (4 volte l'anno):** Uomo/Donna in menopausa

COLAZIONE con tè, succo di frutta e fette biscottate.

NO LATTE, DERIVATI E CIBI GRASSI

VIAGGI?

- **28 gg** dal rientro da zone endemiche per Zica Virus e West Nile Virus
- **6 Mesi** dal rientro da zone Tropicali
- **6/12 Mesi** dal rientro da zone endemiche per Malaria con **Test*** di negatività
- **In caso di nascita/viaggi** in zone endemiche per Trypanosoma Cruzi è richiesto **Test*** di negatività.

Test*: Il prelievo per il test potrà essere effettuato presso il laboratorio CRI sito in Via Bernardino Ramazzini, 15 tel. 0655100786

ESCLUSIONE PERMANENTE

- **Uso di Beta Bloccanti** (anti ipertensivi)
- **Uso di antidepressivi**
- **Tumori maligni** anche pregressi
- **Gravi reazioni allergiche**
- **Malattie cardiovascolari** in atto o pregresse
- **Malattie del sistema nervoso centrale**
- **Alcolismo cronico**
- **Diabete in trattamento insulinico**
- **Droghe maggiori:** uso anche pregresso
- **Malattie infettive:** epatite virale B e C e ad eziologia ignota, sifilide, malaria, babesiosi, lebbra, leishmaniosi

SOSPENSIONE PER 4 MESI

- **Interventi chirurgici maggiori:** 4 mesi dalla completa guarigione clinica
- **Agopuntura, piercing, tatuaggi:** 4 mesi
- **Gastroscopie, colonscopie, endoscopie:** 4 mesi
- **Rapporti sessuali** con partner occasionali o con nuovo partner anche se protetti: 4 mesi
- **Innesto osseo:** 4 mesi
- **Trasfusione di sangue** o di emocomponenti o somministrazione di emoderivati per esempio albumina, immunoglobuline: 4 mesi

SOSPENSIONE PER 6 MESI

- **Mononucleosi, toxoplasmosi e malattia da Citomegalovirus:** 6 mesi dalla completa guarigione documentata
- **Parto/allattamento:** 6 mesi
- **Aborto:** 6 mesi

SOSPENSIONE TEMPORANEA

- **Mestruazioni:** 5/6 giorni prima, 7 giorni dopo
- **Antinfiammatori ed antidolorifici:** 7 giorni
- **Antibiotici:** sospensione di 15 giorni dall'ultima assunzione
- **Cortisonici:** sospensione di 20 giorni dall'ultima assunzione
- **Antistaminici:** sospensione di 4 giorni dall'ultima assunzione
- **Allergie:** idoneo al termine del periodo di manifestazione allergica
- **Interventi chirurgici minori:** 1 settimana dalla completa guarigione clinica
- **Cure odontoiatriche:** estrazioni e devitalizzazioni (se non complicate da infezioni): 7 giorni

Per chiarire ulteriori dubbi potete contattare il Medico CRI al 0655100786 con sede in Via B. Ramazzini 15, 00151 Roma



Croce Rossa Italiana


Comitato Municipi 2-3 di Roma



@CRI.CL.Roma



@criroma2_3



LINEE GUIDA ALLA DONAZIONE DEL SANGUE

CRITERI DI AMMISSIONE O DI ESCLUSIONE ALLA DONAZIONE

COSA DEVI SAPERE PRIMA DI DONARE

- **Età:** dai 18 ai 70 anni - superati i 60 anni ai donatori periodici è richiesto ECG recente
- **Peso:** non inferiore a 50 kg
- **P.A. MAX:** 110-160 **P.A. MIN:** 60-100
- **HB Uomo:** $\geq 13,5$ g/dl
- **HB Donna:** $\geq 12,5$ g/dl
- **F.C:** tra i 50-60 e i 100 bpm
- **Intervallo minimo tra due donazioni:**
 - **Ogni 90 giorni (2 volte l'anno):** Donna in età fertile
 - **Ogni 90 giorni (4 volte l'anno):** Uomo/Donna in menopausa

COLAZIONE con tè, succo di frutta e fette biscottate.

NO LATTE, DERIVATI E CIBI GRASSI

VIAGGI?

- **28 gg** dal rientro da zone endemiche per Zika Virus e West Nile Virus
- **6 Mesi** dal rientro da zone Tropicali
- **6/12 Mesi** dal rientro da zone endemiche per Malaria con **Test*** di negatività
- **In caso di nascita/viaggi** in zone endemiche per Trypanosoma Cruzi è richiesto **Test*** di negatività.

Test*: Il prelievo per il test potrà essere effettuato presso il laboratorio CRI sito in Via Bernardino Ramazzini, 15 tel. 0655100786

ESCLUSIONE PERMANENTE

- **Uso di Beta Bloccanti** (anti ipertensivi)
- **Uso di antidepressivi**
- **Tumori maligni** anche pregressi
- **Gravi reazioni allergiche**
- **Malattie cardiovascolari** in atto o pregresse
- **Malattie del sistema nervoso centrale**
- **Alcolismo cronico**
- **Diabete in trattamento insulinico**
- **Droghe maggiori:** uso anche pregresso
- **Malattie infettive:** epatite virale B e C e ad eziologia ignota, sifilide, malaria, babesiosi, lebbra, leishmaniosi

SOSPENSIONE PER 4 MESI

- **Interventi chirurgici maggiori:** 4 mesi dalla completa guarigione clinica
- **Agopuntura, piercing, tatuaggi:** 4 mesi
- **Gastroscopie, colonscopie, endoscopie:** 4 mesi
- **Rapporti sessuali** con partner occasionali o con nuovo partner anche se protetti: 4 mesi
- **Innesto osseo:** 4 mesi
- **Trasfusione di sangue** o di emocomponenti o somministrazione di emoderivati per esempio albumina, immunoglobuline: 4 mesi

SOSPENSIONE PER 6 MESI

- **Mononucleosi, toxoplasmosi e malattia da Citomegalovirus:** 6 mesi dalla completa guarigione documentata
- **Parto/allattamento:** 6 mesi
- **Aborto:** 6 mesi

SOSPENSIONE TEMPORANEA

- **Mestruazioni:** 5/6 giorni prima, 7 giorni dopo
- **Antinfiammatori ed antidolorifici:** 7 giorni
- **Antibiotici:** sospensione di 15 giorni dall'ultima assunzione
- **Cortisonici:** sospensione di 20 giorni dall'ultima assunzione
- **Antistaminici:** sospensione di 4 giorni dall'ultima assunzione
- **Allergie:** idoneo al termine del periodo di manifestazione allergica
- **Interventi chirurgici minori:** 1 settimana dalla completa guarigione clinica
- **Cure odontoiatriche:** estrazioni e devitalizzazioni (se non complicate da infezioni): 7 giorni

SCANSIONA IL QR CODE PER RIMANERE SEMPRE INFORMATO!



Croce Rossa Italiana

Comitato Municipi 2-3 di Roma



@CRI.CL.Roma



@criroma2_3